


THEORIETOETS



**51st — International
Chemistry Olympiad
France — Paris — 2019**

Making science together!

2019-07-26



	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE	MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
---	---	--

Algemene instructies

- Deze theorietoets bestaat in totaal 72 pagina's.
- Je mag pas beginnen met schrijven als het "Start" signaal is gegeven.
- Je hebt 5 uur om de theorietoets te maken.
- Alle antwoorden en resultaten moeten met pen duidelijk opgeschreven worden in de daarvoor bestemde antwoordboxen. Alleen met pen geschreven antwoorden worden nagekeken en beoordeeld. Antwoorden die buiten de antwoordboxen opgeschreven staan worden niet beoordeeld.
- Als kladpapier kun je de achterzijden van de blaadjes van de theorietoets gebruiken. Denk er aan dat je geen antwoorden buiten de daarvoor bestemde antwoordboxen schrijft, want die worden niet beoordeeld.
- Gebruik uitsluitend de verstrekte pen en rekenmachine.
- Op verzoek kun je de officiële Engelse versie van deze theorietoets ter inzage krijgen.
- Als je naar het toilet wilt of de zaal moet verlaten om wat te eten of drinken, moet je overeenkomstige IChO kaart opsteken. De zaalassistent komt dan naar je toe en zal je naar buiten begeleiden.
- Voor de meerkeuze vragen: als je je antwoord wilt veranderen, vul dan het betreffende antwoordblokje met pen op en maak dan daarnaast zelf een nieuw leeg antwoordblokje.
- De zaalassistent geeft aan wanneer nog 30 minuten werktijd beschikbaar is voordat het "Stop" signaal gegeven wordt.
- Wanneer je niet binnen een halve minuut nadat het "Stop" signaal gegeven is daadwerkelijk bent gestopt met werken en/of schrijven, leidt dat onherroepelijk tot je diskwalificatie van de theorietoets en score 0 voor deze toets.
- Doe de theorietoets (met antwoorden) nadat het "Stop" signaal gegeven is in de daarvoor bestemde examenenvlop en blijf op je plaats zitten. De zaalassistent komt naar je toe om de examenenvlop op te halen.

VEEL SUCCES!

Inhoud

Deze theorietoets bevat 9 opgaven. De weging is tussen haakjes weergegeven.

Opgave T1: Een oneindige potentiaalput en butadieen	(6%)	p. 9
Opgave T2: Productie van waterstofgas door splitsing van water	(7%)	p.14
Opgave T3: Over zilverchloride gesproken	(5%)	p. 21
Opgave T4: Van buskruit tot de ontdekking van jood	(7%)	p. 29
Opgave T5: Azobenzeen – β -cyclodextrine complexen voor de vorming van nanomachines	(8%)	p. 36
Opgave T6: Karakterisering van een block-copolymeer	(8%)	p. 47
Opgave T7: Ringbeweging in een [2]catenaan	(6%)	p.56
Opgave T8: Identificatie en synthese van inositolen	(6%)	p. 62
Opgave T9: Synthese van levobupivacaine	(7%)	p. 68

Fysische constanten en formules

Bij de opdrachten in deze theorietoets mag je ervan uit gaan dat de activiteiten van alle in water opgeloste deeltjes gelijkgesteld (kunnen) worden aan hun concentraties uitgedrukt in mol L⁻¹.

Verder is overal ter vereenvoudiging de standaardconcentratie $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$ weggelaten.

constante van Avogadro

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

gasconstante

$$R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

standaarddruk

$$p^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

atmosferische druk

$$P_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

nulpunt van de Celcius-schaal (0 °C)

$$273,15 \text{ K}$$

constante van Faraday

$$F = 9,649 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$$

watt

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}$$

kilowattuur

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

constante van Planck

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$$

lichtsnelheid in vacuüm

$$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

elementair ladingsquantum

$$e = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

elektronvolt

$$1 \text{ eV} = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

elektrisch vermogen

$$P = U \times I$$

energierendement

$$\eta = E_{\text{nuttig(effectief)}} / E_{\text{ingevoerd(max)}}$$

energie van een foton

$$E = hc/\lambda \text{ of } E = h\nu$$

algemene gaswet

$$pV = nRT$$

gibbs vrije energie


$$G = H - TS$$

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$$

$$\Delta_r G^\circ = -z F E_{\text{cell}}^\circ$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$$

concentratiebreuk Q voor de reactie



$$Q = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$

bufferformule (vergelijking van

Henderson–Hasselbalch)

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

vergelijking van Nernst–Peterson

$$E = E^\circ + \frac{RT}{zF} \ln \frac{[\text{OX}]}{[\text{RED}]}$$

$$\text{bij } T = 298 \text{ K, } \frac{RT}{F} \ln 10 \approx 0,059 \text{ V}$$

$$A = \epsilon lc \text{ (} A = \text{absorbance) of}$$

$$E = \epsilon lc \text{ (} E = \text{extinctie)}$$

wet van Lambert–Beer

reactiesnelheid:

- nulde (0^e) orde

$$[\text{A}] = [\text{A}]_0 - kt$$

- eerste (1^e) orde

$$\ln[\text{A}] = \ln[\text{A}]_0 - kt$$

- tweede (2^e) orde

$$1/[\text{A}] = 1/[\text{A}]_0 + kt$$

halfwaardetijd bij een eerste orde reactie:

$$t_{1/2} = (\ln 2)/k$$

getalgemiddelde molecuulmassa M_n

$$M_n = \frac{\sum_i N_i M_i}{\sum_i N_i}$$

gewichtsgemiddelde molecuulmassa M_w

$$M_w = \frac{\sum_i N_i M_i^2}{\sum_i N_i M_i}$$

Polydispersiteit I_p :

$$I_p = \frac{M_w}{M_n}$$

Periodiek Systeem van de Elementen																18	
1 1A																18 18B	
1 H 1,008	2 2A											13 13B	14 14B	15 15B	16 16B	17 17B	2 He 4,003
3 Li 6,941	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
11 Na 22,99	12 Mg 24,31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 9B	10 10B	11 11B	12 12B	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,64	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc (98)	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57 La 138,9	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (281)	111 Rg (272)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)


Lanthaniden

58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm (145)	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,0	71 Lu 175,0
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Actiniden

90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



¹H NMRChemical shifts van ¹H (in ppm / TMS)

H-H koppelingsconstanten (in Hz)

H type	J _{ab} (Hz)
R ₂ CH _a H _b	4-20
R ₂ H _a C—CR ₂ H _b	2-12 indien vrij draaibaar: 6-8 ax-ax (cyclohexaan): 8-12 ax-eq of eq-eq (cyclohexaan): 2-5
R ₂ H _a C—CR ₂ —CR ₂ H _b	indien vrij draaibaar: < 0,1 anders (star): 1-8
RH _a C=CRH _b	cis: 7-12 trans: 12-18
R ₂ C=CH _a H _b	0,5-3
H _a (CO)—CR ₂ H _b	1-3
RH _a C=CR—CR ₂ H _b	0,5-2,5

eq = equatoriaal, ax = axiaal

IR spectrometrie – groepsfrequenties


vibratie	absorptiegebied σ (cm ⁻¹) (zie opmerking onderaan)	intensiteit
alcohol O—H (strek)	3600-3200	sterk
carbonzuur O—H (strek)	3600-2500	sterk
N—H (strek)	3500-3350	sterk
$\equiv$ C—H (strek)	3300	sterk
=C—H (strek)	3100-3000	zwak
C—H (strek)	2950-2840	zwak
—(CO)—H (strek)	2900-2800	zwak
C $\equiv$ N (strek)	2250	sterk
C $\equiv$ C (strek)	2260-2100	variabel
aldehyde C=O (strek)	1740-1720	sterk
anhydride C=O (strek)	1840-1800; 1780-1740	zwak; sterk
ester C=O (strek)	1750-1720	sterk
keton C=O (strek)	1745-1715	sterk
amide C=O (strek)	1700-1500	sterk
alkeen C=C (strek)	1680-1600	zwak
aromatisch C=C (strek)	1600-1400	zwak
CH ₂ (buig)	1480-1440	middel
CH ₃ (buig)	1465-1440; 1390-1365	middel
C—O—C (strek)	1250-1050	sterk
C—OH (strek)	1200-1020	sterk
NO ₂ (strek)	1600-1500; 1400-1300	sterk

Opmerking: In deze tabel wordt het absorptiegebied weergegeven met het symbool σ voor de golfgetallen. In Nederland wordt het golfgetal aangeduid met het symbool ν .

Opgave	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totaal
T1	Punten	3	4	4	2	3	2	2	4,5	2,5	3	3	33
6%	Score												


Opgave T1: Een oneindige potentiaalput en butadien

Het molecuul buta-1,3-dien wordt meestal weergegeven als $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$, met afwisselend dubbele, enkele en dubbele binding. Echter, de chemische reactiviteit is niet in overeenstemming met deze weergave en de π elektronen worden beter weergegeven door ze te verdelen over de drie bindingen:



Dit systeem kan als een model worden voorgesteld met een eendimensionale doos (d.w.z. een oneindige potentiaalput) waarin de elektronen vrij zijn. De energie van een elektron in een oneindige potentiaalput met lengte L is: $E_n = \frac{n^2 h^2}{8m_e L^2}$. Hierin is n een positief geheel getal (**niet gelijk aan nul**).

1. Twee verschillende modellen worden bekeken. **Schets** ten minste de drie laagste energieniveaus E_n **voor elk model** in de respectievelijke diagrammen, waarbij je laat zien hoe de relatieve energieniveaus verschillen binnen elk model en tussen de twee modellen.



Model 1 (« gelokaliseerd »): De π elektronen zijn gelokaliseerd op de buitenste bindingen en dit resulteert in twee aparte oneindige potentiaalputten met lengte d .

Model 2 (« gedelocaliseerd »): De π elektronen zijn gedelocaliseerd over het gehele molecuul en dit resulteert in één oneindige potentiaalput met lengte $3d$.

2. **Plaats** de π elektronen in het diagram (bij vraag 1) voor model 1 en **geef** de totale energie van het π systeem in model 1 **weer** als functie van h , m_e en d .

$$E(1) =$$

3. **Plaats** de π elektronen in het diagram (bij vraag 1) voor model 2 en **geef** de totale energie van het π systeem in model 2 **weer** als functie van h , m_e en d

$$E(2) =$$


De conjugatie-energie is de totale energie van het eigenlijke π systeem waarvan de som van de energie van etheenmoleculen met hetzelfde aantal elektronen wordt afgetrokken.

4. **Geef** de conjugatie-energie ΔE_c van buta-1,3-dieen **weer** als functie van h , m_e and d .

$$\Delta E_c =$$

De modellen 1 and 2 zijn te veel vereenvoudigd. Een nieuw, gedetailleerder model wordt hierna geïntroduceerd.

5. **Teken** drie andere grensstructuren van buta-1,3-dieen. Gebruik hierbij Lewisstructuren.



Rekening houdend met de omvang van de koolstofatomen, wordt model 2 als volgt aangepast tot model 3:

- de nieuwe lengte van de potentiaalput is L en ligt tussen 0 and L , op de x -as;
- de koolstofatomen liggen, op de x -as, bij $L/8$; $3L/8$; $5L/8$ and $7L/8$.


Voor elk niveau n geldt voor de π golf functie:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

en voor de π elektronendichtheid voor een systeem met $N \pi$ elektronen geldt:

$$\rho(x) = 2 \sum_{i=1}^{N/2} |\psi_i(x)|^2$$

De vier π golf functies die overeenkomen met de moleculaire orbitalen van het π systeem, zijn hieronder weergegeven (in willekeurige volgorde).



6. **Rangschik** de vier π golf functies op energie (E_A , E_B , E_C en E_D).

<
<
<

7. **Geef** de letters (A, B, C of D) van de orbitalen die gevuld zijn met elektronen in buta-1,3-dieen.

8. **Geef**, voor model 3, de waarden van de π golf functies ψ_n voor de bezette niveaus op de posities 0, $L/4$ en $L/2$, voor $n = 1$ en $n = 2$, als functie van L .

$$\psi_1(0) =$$

$$\psi_1\left(\frac{L}{4}\right) =$$

$$\psi_1\left(\frac{L}{2}\right) =$$

$$\psi_2(0) =$$

$$\psi_2\left(\frac{L}{4}\right) =$$

$$\psi_2\left(\frac{L}{2}\right) =$$


9. **Geef**, voor model 3, de waarden van de π elektronendichtheid op de posities 0, $L/4$ and $L/2$.

$$\overline{\rho(0)} =$$

$$\rho\left(\frac{L}{4}\right) =$$

$$\rho\left(\frac{L}{2}\right) =$$

10. **Teken** de π elektronendichtheid tussen 0 en L .



11. **Rangschik** de volgende CC bindingen (B1, B2, ..., B5) op toenemende lengte. Gebruik daarbij de symbolen = of <:

B1: C1C2 in een molecuul buta-1,3-dieen
 B2 : C2C3 in een molecuul buta-1,3-dieen
 B3 : C3C4 in een molecuul buta-1,3-dieen
 B4 : CC in een molecuul ethaan
 B5 : CC in een molecuul etheen

Opgave	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totaal
T2	Punten	1	4	2	3	3	6	4	1	8	2	34
7%	Score											

Opgave T2: Productie van waterstofgas door splitsing van water

Gegevens:

Verbinding	H ₂ (g)	H ₂ O(l)	H ₂ O(g)	O ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	0	-285,8	-241,8	0
S_m° (J mol ⁻¹ K ⁻¹)	130,6	69,9	188,7	205,2

Waterstofgas (H₂) kan gebruikt worden als alternatief voor koolstofdioxide-uitstotende brandstoffen. Het verlagen van de kostprijs en de milieu-impact van de waterstofgasproductie is een belangrijke uitdaging. Het splitsen van water is een veelbelovende technologie in dit onderzoeksveld.

1. **Schrijf** de reactievergelijking op van de splitsing van vloeibaar water. De stoichiometrische coëfficiënt van water in de reactievergelijking is 1.

2. **Ga via berekeningen na** of deze reactie thermodynamisch gunstig is bij 298 K. Maak hiervoor enkel gebruik van de thermodynamische gegevens vermeld in de tabel hierboven.


Berekeningen:

Is de reactie thermodynamisch gunstig?

☐ Ja

☐ Nee

Het splitsen van water kan elektrochemisch uitgevoerd worden met behulp van twee elektroden, aanwezig in een aangezuurd waterbad, die verbonden worden met een spanningsbron (Figuur 1). Aan beide elektroden worden gasbellen gevormd.



Figuur 1 – Elektrochemische cel voor de splitsing van water.

3. **Schrijf** de elektrochemische halfreactie op die plaatsvindt aan elke elektrode.

Aan elektrode (1):

Aan elektrode (2):

4. **Leid** de voorwaarde **af** van de aan toegepaste spanning tussen de twee elektroden $\Delta E_{\text{toegepast}}$ waarbij het proces thermodynamisch gunstig is bij 298 K. $\Delta E_{\text{toegepast}}$ wordt hierbij vergeleken met ΔE_{th} (te berekenen). Alle reagentia en reactieproducten zijn aanwezig in hun standaardtoestand. Maak hiervoor enkel gebruik van de thermodynamische gegevens vermeld in de tabel (of van vraag 2). **Vink** de juiste situatie **aan** en **geef** de waarde van de spanning in drie decimalen.

Berekening:

- ☐ $\Delta E_{\text{toegepast}} = \Delta E_{\text{th}}$
☐ $\Delta E_{\text{toegepast}} > \Delta E_{\text{th}}$, met $\Delta E_{\text{th}} = \dots\dots\dots \text{ V}$ (geef het resultaat met drie decimalen)
☐ $\Delta E_{\text{toegepast}} < \Delta E_{\text{th}}$

Als je ΔE_{th} , niet kunt berekenen, gebruik dan de waarde van 1,200 V in het vervolg van deze opdracht.

Experimenteel is een hogere spanning nodig om water te splitsen. Gebruik makend van een Pt kathode hangt de minimale spanning, $\Delta E_{\min}$, die nodig is om water te splitsen af van het materiaal van de anode zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Anode	$\Delta E_{\min}$ (V)
IrO _x	1,6
NiO _x	1,7
CoO _x	1,7
Fe ₂ O ₃	1,9

Het verschil tussen $\Delta E_{\min}$ en ΔE_{th} is verantwoordelijk voor verliezen in het toestel.

5. **Geef** de uitdrukking van het energierendement η_{elec} (deel van het vermogen dat wordt gebruikt voor de splitsing van water) als functie van ΔE_{th} en $\Delta E_{\min}$. Bereken het energierendement van de elektrolyse van water wanneer een Pt kathode en een Fe₂O₃ anode worden gebruikt. Veronderstel een identieke stroomwaarde I . **Geef** de meest efficiënte anode.

$\eta_{\text{elec}} =$


Energierendement wanneer een Pt en een Fe₂O₃ elektrode worden gebruikt:

$\eta_{\text{elec}} =$ %


Meest efficiënte anode:

Als je η_{elec} niet kunt berekenen, gebruik dan de waarde $\eta_{\text{elec}} = 75\%$ in het vervolg van deze opdracht.

Een alternatief voor de elektrolyse van water is de directe fotokatalytische splitsing van water. Deze maakt gebruik van een halfgeleider die kan geactiveerd worden via de absorptie van licht.



Figuur 2 – Activeringsvoorwaarde en overeenkomstige elektrodepotentialen voor verschillende halfgeleiders. De stippellijnen komen overeen met de oxidatie- en reductiepotentiaal van water.
SHE = Standaardwaterstofelektrode (Standard Hydrogen Electrode)



Figuur 3 – Y-as (linkerkant): Spectraalverdeling van de zon fotonflux ϕ . De fotonflux is het aantal fotonen per oppervlakte eenheid en per tijdseenheid dat de halfgeleider bereikt.
Y-as (rechterkant) en onderbroken lijn: cumulatieve fotonflux (dit is de fractie van de fotonflux met een kleinere golflengte).

6. **Bepaal** door middel van een schatting de fractie van de zon fotonflux die de volgende halfgeleiders kan activeren: TiO_2 , CdS , Si . **Schrijf** de vergelijkingen en eenheden **op** die je gebruikt bij de berekeningen.

Uitleg / berekening:

	Geschatte fractie
TiO_2	%
CdS	%
Si	%

De activering van de halfgeleider wijzigt de oppervlaktepotentialen zodat het beschouwd kan worden als twee elektroden met verschillende potentialen.

7. **Kies** de halfgeleider(s) uit de volgende lijst die, éénmaal geactiveerd, de rol van anode én kathode kunnen vervullen voor de reactie van de splitsing van water. Gebruik hiervoor de data van figuur 2.

☐ ZrO_2	☐ ZnO	☐ TiO_2	☐ WO_3
☐ CdS	☐ Fe_2O_3	☐ CdSe	☐ Si

8. **Geef** de halfgeleider die, gebruikt als kathode en als anode, naar verwachting de meest efficiënte halfgeleider voor de splitsing van water is bij een bepaalde hoeveelheid zonnestraling.

Recentelijk werd de productie van H_2 en O_2 bestudeerd wanneer een halfgeleider wordt bestraald met gesimuleerd zonlicht bij $T = 25\text{ }^\circ\text{C}$ en p_{atm} . De productie van $V = 0,37\text{ cm}^3\text{ H}_2(\text{g})$ werd gemeten na een reactietijd $\Delta t = 1\text{ uur}$ bij gebruik van een invallend lichtvermogen $P = 1,0\text{ kW m}^{-2}$ en een fotoëlektrode met een oppervlakte $S = 16\text{ mm}^2$.

9. **Bereken** het energierendement η_{direct} van deze omzetting.

Berekening:

$\eta_{\text{direct}} =$ %

Als je η_{direct} niet kunt berekenen, gebruik dan de waarde $\eta_{\text{direct}} = 10\%$ in het vervolg van deze opdracht.

Twee manieren om zonne-energie om te zetten naar waterstofgas kunnen dus vergeleken worden: directe fotokatalyse en indirecte foto-elektrolyse waarbij een fotonvoltaïsche cel wordt gecombineerd met een elektrolyse opstelling. De efficiëntie van de fotonvoltaïsche cellen die op de markt zijn is ongeveer $\eta_{\text{panels}} = 20\%$.

10. **Vergelijk** het energierendement van de twee opstellingen, η_{direct} en η_{indirect} . Voor de elektrolyse worden Fe_2O_3 en Pt elektroden gebruikt.

Berekening:

☐ $\eta_{\text{direct}} > \eta_{\text{indirect}}$

☐ $\eta_{\text{direct}} \approx \eta_{\text{indirect}}$

☐ $\eta_{\text{direct}} < \eta_{\text{indirect}}$

Opgave	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
T3	Punten	1	3	3	3	4	2	7	2	2	3	4	6	40
5%	Score													

Opgave T3: Over zilverchloride gesproken

Gegevens bij 298 K:

$$pK_{s1}(\text{AgCl}) = 9,7; pK_{s2}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 12$$

$$\text{Vormingsconstante van het complex } [\text{Ag}(\text{NH}_3)_n]^+: \beta_n = 10^{7,2}$$

Elektrodepotentialen, gemeten tegen de standaardwaterstofelektrode:

$$\text{Standaardelektrodepotential van } \text{Ag}^+/\text{Ag(s)}: E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag(s)}) = +0,80 \text{ V}$$

$$\text{Elektrodepotentiaal van } \text{O}_2(\text{aq})/\text{HO}^-(\text{aq}) \text{ (in zeewater)}: E'(\text{O}_2(\text{aq})/\text{HO}^-(\text{aq})) = +0,75 \text{ V}$$

Deel A: Citaten uit een scheikundeles door Louis Joseph Gay-Lussac

De volgende citaten die afkomstig zijn uit een scheikundeles gegeven door Louis Joseph Gay-Lussac (een Franse chemicus en fysicus, 1778–1850), komen overeen met een aantal eigenschappen van zilverchloride.

Citaat A: “Ik ga het nu hebben over zilverchloride, een melk-witte vaste stof. Het wordt gemakkelijk verkregen door zoutzuur toe te voegen aan een oplossing van zilvernitraat.”

Citaat B: “Dit zout is smaakloos omdat het onoplosbaar is.”

Citaat C: “Deze verbinding is totaal onoplosbaar in alcohol en zelfs in zuren, behalve in geconcentreerd zoutzuur, waarin het gemakkelijk oplost.”

Citaat D: “Anderzijds is zilverchloride zeer goed oplosbaar in ammoniak.”

Citaat E: “Vervolgens kunnen we weer zilverchloride laten ontstaan door een zuur toe te voegen dat met ammoniak reageert.”

Citaat F: “Als je een schaal neemt die is gemaakt van zilver, om zeewater te laten verdampen, krijg je onzuiver natriumchloride dat verontreinigd is met een melk-witte vaste stof.”

1. **Citaat A:** Geef de reactievergelijking van deze vorming van AgCl(s) .

2. **Citaat B:** Bereken de oplosbaarheid s van AgCl(s) in water bij 298 K in mol L^{-1} .

Berekening:

$$s = \quad \text{mol L}^{-1}$$

3. **Citaat C:** In een zeer geconcentreerde oplossing van chloride-ionen wordt een goed gedefinieerd complex gevormd dat de stoichiometrie 1:2 bezit. Plaats op de onderstaande kwantitatieve as (waarop pCl toeneemt van links naar rechts) in elk gedeelte het zilverbevattende deeltje dat het meest voorkomt (of, voor vaste stoffen, bestaat). pCl waarden op de grenzen tussen de verschillende gedeeltes zijn niet te verwachten.



Citaat D: Als ammonia wordt toegevoegd aan zilverchloride, wordt een goed gedefinieerd complex met de index n gevormd.

4. **Geef** de reactievergelijking van de vorming van het complex $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_n]^+$ uit zilverchloride en **bereken** de bijbehorende evenwichtsconstante.

Reactievergelijking:

Berekening:

$$K =$$

Als je K niet kunt berekenen, gebruik dan de waarde $K = 10^{-3}$ in het vervolg van deze opgave.

5. Ammonia wordt toegevoegd aan 0,1 mol zilverchloride in 1 L water totdat het laatste korreltje vaste stof verdwijnt. Op dat moment geldt dat $[\text{NH}_3] = 1,78 \text{ mol L}^{-1}$. **Bepaal door middel van een berekening** de index n . Verwaarloos daarbij effecten ten gevolge van verdunning.

Berekening:

$$n =$$

6. **Geef** de reactievergelijking die overeenkomt met **citaat E**.

7. **Geef** de reactievergelijking die overeenkomt met de vorming van de vaste stof die is genoemd in **citaat F**. Neem hierbij aan dat zeewater enigszins basisch is en rijk aan zuurstof, en dat het metaal zilver onder die omstandigheden zuurstof kan reduceren. Voor zuurstof moet hierbij de coëfficiënt 1 worden gekozen. **Bereken** de evenwichtsconstante van deze evenwichtsreactie bij 298 K.

Reactievergelijking:

Berekening:

$K =$

Deel B: De bepaling volgens Mohr

De bepaling volgens Mohr is gebaseerd op de colorimetrische titratie van Cl^- met Ag^+ in de aanwezigheid van kaliumchromaat (2K^+ , CrO_4^{2-}). Drie druppels ($\sim 0,5 \text{ mL}$) van een K_2CrO_4 oplossing met een molariteit van ongeveer $7,76 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ worden toegevoegd aan $V_0 = 20,00 \text{ mL}$ natriumchloride –oplossing met een onbekende concentratie C_{Cl} . Deze oplossing wordt vervolgens getitreerd met een oplossing van zilvernitraat (Ag^+ , NO_3^-) waarvan $C_{\text{Ag}} = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Dit leidt onmiddellijk tot de vorming van vaste stof **A**. Er verschijnt een rood neerslag (vaste stof **B**) wanneer $V_{\text{Ag}} = 4,30 \text{ mL}$ is toegevoegd.

8. **Geef** de reactievergelijkingen van de twee reacties die tijdens deze bepaling optreden. **Bereken** de evenwichtconstanten die hierbij horen.

Vergelijking 1:

Berekening 1:

$$K_1^\circ =$$

Vergelijking 2:

Berekening 2

$$K_2^\circ =$$

9. **Geef** de formules van de vaste stoffen.

Vaste stof **A**:

Vaste stof **B**:

10. **Bereken** de onbekende concentratie C_{Cl} van de chloride-ionen in de natriumchlorideoplossing.

Berekening:

$$C_{\text{Cl}} = \quad \text{mol L}^{-1}$$

Als je C_{Cl} niet kunt berekenen, gebruik dan de waarde $C_{\text{Cl}} = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$ in het vervolg van deze opgave.

11. **Bereken** het volume $V_{\text{Ag}}(\text{min})$ dat minstens moet worden toegevoegd totdat $\text{AgCl}(\text{s})$ wordt gevormd.

Berekening:

$$V_{\text{Ag}}(\text{min}) = \quad \text{mL}$$

12. **Bereken** de resterende concentratie $[\text{Cl}^-]_{\text{rest}}$ van chloride-ionen wanneer vast zilverchromaat begint te ontstaan. **Motiveer**, door twee waarden met elkaar te vergelijken, waarom CrO_4^{2-} een geschikte indicator is om het equivalentiepunt te bepalen bij deze titratie.

Berekening:

$$[\text{Cl}^-]_{\text{res}} = \quad \text{mol L}^{-1}$$

CrO_4^{2-} is een geschikte indicator voor deze titratie omdat:

Opgave	vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
T4	Punten	6	9	8	5	6	2	2	12	50
7%	Score									

Opgave T4: Van buskruit tot de ontdekking van jood

In de 19^e eeuw gebruikte de Franse ondernemer B. Courtois het nitraat **A** ($\mathbf{M_A(NO_3)_m}$) voor buskruit. Het nitraat **A** werd oorspronkelijk uit Azië geïmporteerd, maar werd later gemaakt uit nitraat **B** ($\mathbf{M_B(NO_3)_n}$), door middel van een uitwisselingsreactie met verbinding **C**, afkomstig van algen.

1. **Bepaal** de formules van de nitraten **A** en **B** als gegeven is dat beide nitraten watervrije zouten zijn van alkalimetalen of aardalkalimetalen ($\mathbf{M_A}$ en $\mathbf{M_B}$). Een van de nitraten bevat niet meer dan 1 massa-% niet-metallische verontreinigingen, terwijl het andere nitraat 9 ± 3 massa-% verontreinigingen bevat. Het massapercentage van de metalen $\mathbf{M_A}$ en $\mathbf{M_B}$ in de betreffende nitraten is respectievelijk 38,4 massa-% en 22,4 massa-%. **Licht je antwoord toe** met berekeningen.

A:

en B:

Om A te verkrijgen wordt 262,2 g van vaste stof **C** toegevoegd aan een oplossing die 442,8 g **B** bevat. Bekend is hierbij dat **B** in overmaat aanwezig is. Bij deze reactie wordt 190,0 g van een wit neerslag **D** gevormd dat met filtratie verwijderd wordt. Het filtraat wordt ingedampt waarbij het residu **E**, een vast mengsel, overblijft. Dit mengsel (dat uitsluitend nitrieten NO_2^- bevat) wordt verhit totdat de massa van dit mengsel constant blijft. Het enige gasvormige product dat bij deze verhitting ontstaat, is zuurstof: 60,48 L ($=\text{dm}^3$) bij 0 °C en 1 atm (zuurstof mag als een ideaal gas worden beschouwd).

2. **Bereken** de samenstelling (in massa-%) van het mengsel **E**, ervan uitgaande dat het mengsel uitsluitend de verbindingen **A** en **B** bevat en verder geen andere onzuiverheden. Verder is gegeven dat de toegevoegde verbinding **C** watervrij was.

massa-% **A**:

massa-% **B**:

3. **Leid**, door middel van berekeningen, de formules **af** van de verbindingen **C** en **D** en **noteer** de reactievergelijking van de reactie tussen **B** en **C**.

C:

en **D:**

Reactievergelijking van de reactie tussen **B** en **C**:


In 1811 ontdekte Courtois, terwijl hij met de as van algen werkte, dat koperen vaten sneller sleten dan gewoonlijk. Terwijl hij dit fenomeen aan het onderzoeken was, kwam zijn kat het laboratorium binnen en stootte de fles geconcentreerd zwavelzuur om, zodat de inhoud in contact kwam met de droge algen-as in een koperen vat. Onmiddellijk kwam er een paarse damp uit het vat. (1, zwavelzuur is de oxidator): jood (I_2) was zojuist ontdekt! Jood was de oorzaak van de oxidatie van koper (2). Vanwege de vraag naar jood voor medicinale toepassingen, opende Courtois een nieuwe fabriek om jood te produceren door middel van de reactie van algen met chloor (3).

Tegenwoordig wordt jood gemaakt uit de combinatie van reactanten (NO_3^- , I^- , H^+) (4) of (IO_3^- , I^- , H^+) (5).

4. **Noteer** de reactievergelijkingen voor de reacties 1–5.

1
2
3
4
5


De oplosbaarheid van jood in water is erg klein, maar die neemt significant toe als jodide ionen worden toegevoegd. Het jood vormt samen met het jodide het zogenoemde trijodide, I_3^- :




Evenwicht (6) kan bestudeerd worden door de extractie van I_2 met dichloormethaan. I^- en I_3^- lossen niet op in organische oplosmiddelen, maar I_2 wel. Bij de extractie met dichloormethaan is de concentratie van I_2 in dichloormethaan 15 keer groter dan in water.

Het volgende experiment werd uitgevoerd. Een paar kristallen vast jood werden opgelost in 50,0 mL van een (waterige) oplossing van kaliumjodide (0,1112 g); dit is de zogenoemde beginoplossing. Vervolgens werd 50,0 mL dichloormethaan aan de beginoplossing toegevoegd en het zo verkregen mengsel werd goed geschud totdat evenwicht werd bereikt. Nadat beide fasen van elkaar gescheiden waren, werd iedere fase getitreerd met een standaardoplossing van natriumthiosulfaatpentahydraat (14,9080 g in 1,000 L oplossing) in aanwezigheid van zetmeel (=stijfsel). Voor de organische fase was 16,20 mL thio nodig en voor de waterige fase 8,00 mL.

Het beschreven proces in schematisch weergegeven in de onderstaande figuur:



Initial solution = beginoplossing, phase separation = fasescheiding, until near endpoint = tot vlak voor het eindpunt, add starch = voeg zetmeel toe, titration till end = titreren tot het eindpunt.



CLess = colourless Dk = dark

Brown = bruin, blue = blauw, pink = roze, Dk purple = donker paars, CLess == kleurloos, Yellowish = geelachtig,

5. **Noteer** hieronder bij de nummers uit het schema (1–9) de letters van de plaatjes (a–i) die ermee overeenkomen.

Stadia	Plaatje
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. **Noteer** de reactievergelijkingen voor de twee mogelijke chemische reacties in de waterige fase bij de titratie van joodbevattende deeltjes met natriumthiosulfaat.

7. **Bereken** de massa van het benodigde jood voor de bereiding van de beginoplossing.

$$m(\text{I}_2) = \quad \text{g}$$

8. **Bereken** de evenwichtsconstante K° voor het evenwicht van reactie (6).

$$K^\circ =$$


Opgave	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
T5	Punten	3	4	4	2	5	5	4	3	5	2	2	2	41
8%	Score													

Opgave T5: Azobenzeen – β -cyclodextrine complexen voor de vorming van nanomachines

Nanomachines zijn samengestelde moleculen die in staat zijn een energiebron om te zetten in een nano-beweging, bijvoorbeeld te gebruiken bij de toediening van medicijnen. Talrijke nanomachines maken gebruik van de isomerisatie van azoverbindingen ($R-N=N-R'$) na bestraling.

1. **Teken** de stereo-isomeren van azobenzeen ($H_5C_6-N=N-C_6H_5$) en **teken** een lijn tussen de twee koolstofatomen die het verst van elkaar afliggen. **Vergelijk** deze twee afstanden (d_{trans} en d_{cis}).

<i>trans</i>	<i>cis</i>
Vergelijking: d_{trans} d_{cis}	




Figuur 1 – Mogelijke reagentia voor de synthese van **M**.

2. **M** kan met behulp van eenvoudige reagentia in twee stappen worden bereid (Figuur 1). **Kies** tussen de voorgestelde reagentia (**N** tot en met **Q**) degenen die **M** kunnen opleveren met een zeer hoge regioselectiviteit. Natriumnitriet (NaNO_2), aanwezig in een koude waterige zoutzuuroplossing, wordt in de eerste stap van de synthese als reagens gebruikt.

Reagentia: _____ en _____

Bepaling van de vormingsconstante K_t

β -cyclodextrine (**C**, Figuur 2) is een cyclisch heptameer van glucose dat insluitingscomplexen kan vormen met azoverbindingen. Bij vragen 3 tot en met 6 bepalen we via spectroscopie de vormingsconstante K_t , die hoort bij de vorming van het insluitingscomplex CM_{trans} zoals afgebeeld in Figuur 2.



Figuur 2 – Vorming van het insluitingscomplex CM_{trans} .

Verschiedende oplossingen worden bereid door het mengen van **C** en M_{trans} in verschillende verhoudingen. De beginconcentraties worden voorgesteld als $[\text{C}]_0$ en $[\text{M}_{\text{trans}}]_0$. $[\text{M}_{\text{trans}}]_0$ is identiek voor alle oplossingen, terwijl $[\text{C}]_0$ varieert. De wijziging in het verschil in absorbance (= extinctie) tussen elke oplossing en de zuivere M_{trans} oplossing, ΔA , wordt gevolgd bij een vaste golflengte. De molaire absorptiecoëfficiënten (= extinctiecoëfficiënten) van CM_{trans} en M_{trans} zijn respectievelijk $\epsilon_{\text{CM}_{\text{trans}}}$ en $\epsilon_{\text{M}_{\text{trans}}}$. L is de weglengte van de lichtstraal door de oplossing. De absorbance (= extinctie) van **C** (ϵ_{C}) is verwaarloosbaar.

3. **Toon aan** dat $\Delta A = \alpha \cdot [\mathbf{C} \mathbf{M}_{\text{trans}}]$. **Druk α uit** in termen van bekende constante(n).

Afleiding van de vergelijking:

$$\alpha =$$

4. **Toon aan** dat wanneer $\mathbf{C}$ in grote overmaat is ten opzichte van $\mathbf{M}_{\text{trans}}$ (dat wil zeggen $[\mathbf{C}]_0 \gg [\mathbf{M}_{\text{trans}}]_0$), de concentratie van $\mathbf{C}$ als constant beschouwd mag worden, $[\mathbf{C}] \simeq [\mathbf{C}]_0$.


Afleiding:

5. **Toon aan** dat wanneer **C** in grote overmaat is ten opzichte van **M_{trans}** (dat wil zeggen $[C]_0 \gg [M_{trans}]_0$), $\Delta A = \alpha \cdot \frac{\beta \cdot [C]_0}{1 + K_t \cdot [C]_0}$. **Druk β uit** via constante(n) en beginconcentratie(s).

Afleiding van de vergelijking:

$$\beta =$$

6. **Bereken** K_t via de volgende experimentele curve (Figuur 3).




Figuur 3 – Verloop van $1/\Delta A$ als een functie van $1/[C]_0$.

Berekeningen:

$$K_t =$$

Bepaling van de vormingsconstante K_c

Bij vragen 7 tot en met 9 bepalen we via kinetiekstudies de vormingsconstante K_c , die hoort bij de vorming van het insluitingscomplex met M_{cis} , namelijk CM_{cis} . Een monster dat enkel M_{trans} bevat, wordt bestraald. Hierbij wordt een gekende hoeveelheid M_{cis} geproduceerd, $[M_{cis}]_0$. M_{cis} (vrij of aanwezig in het inclusiecomplex) wordt thermisch geïsomereerd tot M_{trans} . In afwezigheid van **C** verloopt de isomerisatie via een eerste orde kinetiek met een reactiesnelheidsconstante k_1 . Alle complexatie-evenwichten verlopen sneller dan het isomerisatieproces. Het kinetiekschema dat overeenkomt met dit experiment wordt voorgesteld in Figuur 4.



Figuur 4 – Kinetiekschema voor de isomerisatie van M_{cis} in aanwezigheid van **C**.

De verdwijningssnelheid r voor de totale hoeveelheid $\mathbf{M}_{\text{cis}}$ (vrij en gecomplexeerd) wordt gedefinieerd als

$$r = k_1[\mathbf{M}_{\text{cis}}] + k_2[\mathbf{CM}_{\text{cis}}]$$

Experimenteel volgt r een schijnbare eerste orde kinetiek met een schijnbare reactiesnelheidsconstante k_{obs}

$$r = k_{\text{obs}}([\mathbf{M}_{\text{cis}}] + [\mathbf{CM}_{\text{cis}}])$$

7. **Toon aan** dat $k_{\text{obs}} = \frac{\gamma + \delta \cdot k_2[\text{C}]}{1 + K_{\text{C}}[\text{C}]}$. **Druk** γ en δ **uit** via gekende constante(n).

Afleiding:

$$\gamma =$$

en

$$\delta =$$

8. **Kies** onder welke voorwaarde(n) de halfwaardetijd $t_{1/2}$ wordt uitgedrukt als $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma} (1 + K_c[\mathbf{C}]_0)$. De halfwaardetijd $t_{1/2}$ komt overeen met k_{obs} en $[\mathbf{C}]_0 \gg [\mathbf{M}_{\text{cis}}]_0$.


Verantwoord jouw antwoord met de nodige vergelijkingen.

- ☐ Zeer trage isomerisatie van $\mathbf{M}_{\text{cis}}$ binnen cyclodextrine
- ☐ Zeer trage isomerisatie van vrij $\mathbf{M}_{\text{cis}}$
- ☐ $\mathbf{CM}_{\text{cis}}$ zeer stabiel
- ☐ $\mathbf{CM}_{\text{trans}}$ zeer stabiel

Afleiding:


9. Neem aan dat aan de voorwaarde(n) in vraag 8 voldaan is/zijn. **Bereken** de waarde van K_c via een lineaire regressie met behulp van onderstaande data. Je mag hiervoor een rekenmachine gebruiken of een diagram opstellen.

$[C]_0$ (mol L ⁻¹)	$t_{1/2}$ (s)	$[C]_0$ (mol L ⁻¹)	$t_{1/2}$ (s)
0	3,0	$3,0 \cdot 10^{-3}$	5,9
$1,0 \cdot 10^{-4}$	3,2	$5,0 \cdot 10^{-3}$	7,7
$5,0 \cdot 10^{-4}$	3,6	$7,5 \cdot 10^{-3}$	9,9
$1,0 \cdot 10^{-3}$	4,1	$1,0 \cdot 10^{-2}$	12,6



Vergelijking van de ijklijn:

$$K_c =$$

Vorming van nanomachines


Figuur 5 – *Splitsing van een azobenzeen–cyclodextrine insluitingscomplex geïnduceerd door een door licht getriggerde isomerisatie. Het gevolg is het vrijkomen van een verfstof (grijs bolletje).*

Een andere azobenzeenverbinding (waarbij $K_c \ll K_t$), oorspronkelijk in de *trans*-vorm, wordt covalent gebonden op silica (Figuur 5). De silicaporiën worden opgevuld met een verfstof (rhodamine B, grijs bolletjes in Figuur 5). Bij toevoeging van **C**, wordt een insluitingscomplex gevormd. Dit complex blokkeert de poriën en verhindert het vrijkomen van de verfstof.

10. **Kies** de meest geschikte toestand (één keuze) zodat de poriën oorspronkelijk zijn geblokkeerd in de aanwezigheid van **C** en de verfstof kan vrijgegeven worden na bestraling.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ☐ | $K_t \gg 1$ |
| ☐ | $K_t \gg 1$ en $K_c \ll 1$ |
| ☐ | $K_t / K_c \ll 1$ |
| ☐ | $K_t \gg 1$ en $K_c \gg 1$ |
| ☐ | $K_c \ll 1$ |

Dit azobenzeen-silica poeder opgevuld met een verfstof wordt geplaatst in een hoek van de cuvet (Figuur 6) zodat het poeder zich niet kan verplaatsen in de oplossing. Het poeder wordt bestraald met licht van een golflengte λ_1 zodat de vrijstelling van de verfstof uit de poriën wordt geactiveerd (Figuur 5). Om de vrijstelling via absorbance (= extinctie) spectroscopie te volgen wordt de absorbance (=extinctie) van licht met golflengte λ_2 door de oplossing gemeten.



Figuur 6 – Links: Experimentele opstelling voor het volgen van de vrijstelling van de verfstof; rechts: absorptie (=extinctie) spectra van trans-azobenzeen (doorgetrokken lijn), cis-azobenzeen (stippellijn) en rhodamine B (onderbroken lijn).

11. **Bepaal** de waarde van λ_1 .

$\lambda_1 =$ nm

12. **Bepaal** de waarde van λ_2 .


$\lambda_2 =$ nm

Opgave T6 8%	Vragen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totaal
	Punten	4	4	5	3	10	2	9	6	5	48
	Score										

Opgave T6: Karakterisering van een block-copolymeer

Block-copolymeren, verkregen door het aan elkaar schakelen van verschillende polymeren (blocks), hebben unieke eigenschappen, zoals de mogelijkheid tot zogenoemde zelfassemblage. In deze opgave worden de synthese en karakterisering van zulke macromoleculen nader onderzocht.

Onderzoek van het eerste block




In dit eerste deel bekijken we het in water oplosbare homopolymeer **1** (α -methoxy- ω -aminopolyethyleenglycol).

Het ^1H NMR spectrum van **1** ($\text{DMSO}-d_6$, 60 °C, 500 MHz) bevat de volgende signalen:

piek	chemical shift δ (ppm)	oppervlakte-integraal A
a	2,7*	0,6
b	3,3	0,9
c	3,4	0,6
d	$\sim 3,5$	133,7

Tabel 1, *in aanwezigheid van D_2O , verdwijnt het signaal bij 2,7 ppm.

1. **Vul hieronder in:** De ^1H NMR signalen (a, b, c, d) uit tabel 1 bij de corresponderende protonen.




2. **Druk** de gemiddelde polymerisatiegraad n uit als functie van de oppervlakte-integraal $A_{\text{OC}_2\text{H}_4}$ van de NMR piek van de repeterende eenheid en de oppervlakte-integraal A_{OCH_3} van de NMR piek van de methyl eindgroep. **Bereken** n .

$$n =$$


Als je n niet hebt kunnen berekenen, neem dan voor het vervolg in deze opgave $n = 100$.

Onderzoek van het diblock-copolymeer

De synthese van het tweede block van het copolymeer wordt uitgevoerd via een reactie van **1** met **2** (ϵ -(benzyloxycarbonyl)-lysine N -carboxyanhydride). Het resultaat is block-copolymeer **3**.




3. **Teken** het reactie intermediair dat gevormd wordt tijdens de eerste stap van de additie van **1** aan **2**. De tweede stap van het mechanisme leidt tot de vorming van een molecuul van een gas, **G**. **Teken** de structuur van **G**.




G:

4. Infrarood (IR) metingen worden uitgevoerd om de verbindingen te karakteriseren. **Relateer** de drie IR spectra aan de corresponderende verbindingen **1**, **2** and **3**. *Opmerking: In deze spectra is op de X-as het golfgetal weergegeven met het symbool σ . In Nederland wordt het golfgetal aangeduid met het symbool ν .*




5. Het ^1H NMR spectrum van copolymeer **3** (in $\text{DMSO-}d_6$, bij $60\text{ }^\circ\text{C}$, 500 MHz) is weergegeven in onderstaande figuur 1. **Bereken** de getalgemiddelde molecuulmassa M_n . Houd hierbij rekening met de gemiddelde polymerisatiegraad n van vraag 2 en gebruik hierbij sommige of alle NMR signalen waarvan de oppervlakte-integralen zijn gegeven in tabel 2. **Teken** een cirkel om de groep(en) van atomen die je gebruikt hebt voor je berekeningen en **noteer** bij iedere cirkel het bijbehorende pieksymbool (α , β , ...).



Tabel 2


Piek	Oppervlakte-integraal A
α	22,4
β	119
γ	23,8
δ	47,6
ϵ	622

Figuur 1 – de signalen aangegeven met een * corresponderen met het oplosmiddel en water.



$M_n =$ kg mol⁻¹
Geef je antwoord in twee decimalen.

De reactie van **1** met **2** geeft de copolymeren **3a** na 20 u, **3b** na 25 u en **3c** na 30 u reactie bij 40 °C. Resultaten van deze *size-exclusion chromatography* (SEC) experimenten zijn weergegeven in figuur 2.




Figuur 2 – SEC chromatogrammen van **3a**, **3b** en **3c** als functie van het elutievolumen, V_e .

6. **Relateer** de signalen in figuur 2 aan de copolymeren **3a**, **3b** en **3c**.

3a:	☐ X	☐ Y	☐ Z
3b:	☐ X	☐ Y	☐ Z
3c:	☐ X	☐ Y	☐ Z

Om de chromatogrammen te ijken wordt een mengsel van standaardpolymeren met bekende massa's (3, 30, 130, 700 en 7000 kg mol⁻¹) bestudeerd (Figuur 3).


De log-waarde van de molaire massa is een lineaire functie van het elutievolumen, V_e .



Figuur 3 – SEC chromatogram van het mengsel van de standaard polymeren.

7. **Bepaal** aan de hand van de SEC-curves in figuur 2 en in figuur 3 het volume V_e van het polymeer dat overeenkomt met curve X. **Bepaal** met behulp hiervan de polymerisatiegraad m van het tweede block. **Werk** je berekeningen **uit**; je mag een rekenmachine gebruiken of een grafiek maken.


$V_e =$ mL



$m =$

Triblock copolymer synthesis

Voor biologische toepassingen zoals de vorming van micellen, kan het triblock copolymeer **9** gesynthetiseerd worden door de introductie van een midden block, **B**, waarbij gebruik gemaakt wordt van monomeer **5**.



8. **Teken** de structuren van **5**, **7** en **8**.

5 (geen andere producten dan **6:A-B** worden gevormd)

7 (tijdens de laatste stap wordt een gas gevormd)

8


9. Amfifilische block copolymeren, zoals **9: A-B-C**, kunnen gebruikt worden voor medische toepassingen, omdat ze in water (pH = 7) zelfassembleren tot micellen. De micellen kunnen dan gebruikt worden als medicijndragers. **Ken** aan ieder block van het copolymeer een eigenschap **toe**. **Teken** schematisch een micel met slechts maar 4 polymeerketens.

A:	☐ hydrofoob	☐ hydrofiel
B:	☐ hydrofoob	☐ hydrofiel
C:	☐ hydrofoob	☐ hydrofiel

A 

B 


C 


⇌

Opgave T7: Ringbeweging in een [2]catenaan


Opgave	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totaal
T7	Punten	4	12	2	2	2	5	5	8	4	5	5	54
6%	Score												

In 2016 wonnen J.-P. Sauvage, Sir J. F. Stoddart en B. L. Feringa, de Nobelprijs voor scheikunde met "het ontwerpen en synthetiseren van moleculaire machines". Een voorbeeld hiervan is het [2]catenaanmolecuul dat bestaat uit twee in elkaar gesloten ringen. Eén ring bevat een enkel fenanthroline (bidentaat) ligand en de tweede ring bevat twee liganden: een fenanthroline en een terpyridine (tridentaat) ligand. Een koper ion wordt omringd door een ligand van elke ring. Er kunnen twee configuraties worden verkregen afhankelijk van het oxidatiegetal van het koperion (+I of +II), zie figuur 1.



Figuur 1 – Multistabiliteit van een ring in een [2]catenaanmolecuul.

De synthese van een ring verloopt als volgt:



1. **Teken** de structuurformule van **B**.

B

2. **Teken** de structuurformules van **E**, **F** en **G**.

E

F

G

3. **Kies** uit de volgende reactiecondities welke geschikt is om product **E** te verkrijgen uit **D**:

- ☐ H^+ , H_2O
- ☐ OH^- , H_2O
- ☐ NaBH_4 , CH_3OH
- ☐ H_2 , Pd/C , THF

4. MsCl wordt in de synthese gebruikt om te zorgen voor:

- ☐ een vertrekkende groep
- ☐ een beschermende groep
- ☐ een deactiverende groep
- ☐ een sturende groep


5. **G** wordt verkregen in een reactie van **F** met LiBr in aceton. Deze reactie is:

- ☐ een elektrofile aromatische substitutie
- ☐ een nucleofiele aromatische substitutie
- ☐ S_N1
- ☐ S_N2

6. **Teken** de overgangstoestand van de snelheidsbepalende stap van de reactie **F** → **G**. Laat de 3D geometrie van het reactiecentrum zien. Gebruik het symbool R om de koolstofrestgroep weer te geven.

Overgangstoestand:

Bij de synthese van het [2]catenaanmolecuul **L** wordt gebruik gemaakt van het ‘template effect’ van het kopercomplex:



7. **Geef** de volledige elektronenconfiguratie van Cu(0) in de grondtoestand. Geef de oxidatietoestand van Cu in complex **J** en geef de elektronenconfiguratie van het vrije Cu ion zoals het in complex **J** voorkomt.

Elektronenconfiguratie van Cu(0):

Oxidatietoestand van Cu in **J**:

Elektronenconfiguratie van Cu in **J**:

8. **Selecteer** het vakje dat de geometrie van het koperion in **L** juist weergeeft. **Teken** de energieniveaus van de d-orbitalen in het kristalveld waarbij aangenomen wordt dat de liganden een ideale geometrie hebben rond het kopercentrum. **Vul** het orbitaaldiagram met elektronen. **Geef** de maximale waarde van de spin (S) van het complex.

De geometrie van Cu in **L** is:


- ☐ Octaëdrisch
☐ Tetraëdrisch
☐ Vierkant planair
☐ Trigonaal bipyramidaal

Opsplitsing en vulling van de d-orbitalen:


$S =$

9. **Kies** de juiste verbinding(en), uit de volgende mogelijkheden, waarmee het koperion in **L** kan worden verwijderd zodat het vrije [2]catenaanmolecuul wordt verkregen:

- ☐ CH₃CN
☐ NH₄PF₆
☐ KCN
☐ tren



Het koperion in het [2]catenaanmolecuul **L** kan in twee oxidatietoestanden (+I) or (+II) voorkomen, en omringing is in beide gevallen verschillend (tetra- of penta-omringing, respectievelijk).



Figuur 2 – [2]catenaanmolecuul **L** in verschillende toestanden

De stabiliteit van de Cu(I)-complexen kan worden bepaald door de elektronenstructuur van het Cu(I) complex te vergelijken met de elektronenstructuur van een edelgas.

10. **Vul** op de stippellijn de juiste nummers in en vink tenslotte het juiste blokje aan:

Het $\text{Cu}^{\text{I}}\text{N}_4$ complex heeft ... elektronen in de coördinatie rond het metaal.

Het $\text{Cu}^{\text{I}}\text{N}_5$ complex heeft ... elektronen in de coördinatie rond het metaal.

Het $\text{Cu}^{\text{I}}\text{N}_4$ complex is ☐ meer / ☐ minder stabiel dan het $\text{Cu}^{\text{I}}\text{N}_5$ complex.


11. **Vul** in onderstaande omlijnde kaders de juiste naam van het complex (code) in zoals weergegeven in Figuur 2. **Vul** het geheel **aan** door in de gestippelde kaders de elektrochemische controle van het systeem aan te geven. Gebruik hiervoor:  (rotatie); $+e^-$; $-e^-$.

$\text{Cu}^{\text{I}}\text{N}_4$	→	
↑		↓
	←	


Opgave T8 6%	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Totaal
	Punten	2	6	2	2	11	2	4	3	4	2	6	8	2	6	4	64
	Score																

Opgave T8: Identificatie en synthese van inositolen

In deze opgave wordt “3D structuur” en “formule-in-perspectief” gedefinieerd zoals in de onderstaande figuur voor β -glucose is weergegeven.



3D structuur



formule-in-perspectief

Inositolen zijn cyclohexaan-1,2,3,4,5,6-hexolderivaten. Sommige van deze derivaten, in het bijzonder *myo*-inositol, zijn in een aantal biologische processen betrokken.


Structuur van *myo*-inositol

1. **Teken** de structuurformule van inositol zonder stereochemische details.

Er zijn 9 verschillende stereo-isomeren van inositol, waaronder enantiomeren.

2. **Teken** de 3D structuren van alle stereo-isomeren van inositol die optisch actief zijn.


De structuur van één specifieke inositol, genaamd *myo*-inositol, wordt hier bestudeerd. Eén van de stoelvormen komt het meeste voor en de structuur kan met ^1H NMR spectroscopie worden bepaald. Het spectrum gemeten bij 600 MHz in D_2O is hieronder weergegeven. Er zijn geen andere signalen van de verbinding dan diegene die zijn weergegeven. De integraal van elk signaal is onder het signaal weergegeven.



3. **Geef** de molecuulformule van het meest voorkomende *myo*-inositol die in overeenstemming is met het aantal protonen die afgeleid kunnen worden uit bovenstaand ^1H NMR spectrum.


4. **Geef** het aantal symmetrievlakken die in het molecuul aanwezig moeten zijn gebaseerd op het aantal protonsignalen en de integralen van de protonsignalen.

5. **Vul** de volgende formule-in-perspectief van de meeste stabiele conformatie van *myo*-inositol **aan**. **Label** vervolgens elk waterstofatoom met de corresponderende letter (**a**, **b**, **c** of **d**) volgens bovenstaande NMR spectrum. Proton **a** moet op koolstofatoom **a** gebonden zijn zoals hieronder weergegeven. **Teken** tenslotte de 3D structuur.



Synthese of inositolen


Het is voor medische toepassingen handig om sommige inositolfosfaten in grote hoeveelheden te kunnen synthetiseren. In deze opgave wordt de synthese van inositol **2** uit broomdiol **1** bestudeerd.



6. **Kies** de juiste structuurrelatie tussen structuur **2** en **3**.

- | |
|---|
| ☐ enantiomeren
☐ epimeren
☐ diastereo-isomeren
☐ atropisomeren |
|---|


Inositol **2** kan uit verbinding **1** in 7 stappen worden verkregen.



7. **Teken** de 3D structuur van **4**.

4

8. De reactie die tot **5** leidt vindt plaats aan de dubbele binding met de hoogste elektronendichtheid. Beschouw onderstaande structuur van 1-broom-1,3-cyclohexadien, een afgeleide structuur van **4**. **Omcirkel** de dubbele binding met de hoogste elektronendichtheid. **Geef** alle door het broomatoom geïnduceerde elektrische effecten weer in aparte structuren.



9. **Teken** de 3D structuur van de meest voorkomende diastereo-isomeer van **5**.

5

10. **Geef** het totaal aantal stereo-isomeren van **5** die mogelijk zijn bij de synthese uitgaande van de zuivere enantiomeer verbinding **1**.

11. In de reactiestap van **5** $\rightarrow$ **6** kan er een andere verbinding, weergegeven met **6'**, met dezelfde molecuulformule ontstaan. **Teken** de 3D structuren van **6** en **6'**.

6

6'

12. **Teken** de 3D structuren van de meest voorkomende diastereo-isomeren **8** en **9**.

8

9

13. **Kies** het vakje met de juiste set reactieomstandigheden **A** om verbinding **2** te verkrijgen.

- ☐ H₂, Pd/C
☐ K₂CO₃, HF
☐ HCOOH, H₂O
☐ BF₃·OEt₂

14. Een andere stereo-isomeer, naast verbinding **2**, wordt verkregen als broom niet aanwezig is in verbinding **1**. **Teken** de 3D structuur van de stereo-isomeer die ontstaat als alle reacties met dezelfde stereoselectiviteit verlopen, en met dezelfde aantal equivalenten als voor **2**. **Geef** de relatie met **2**.

-
- ☐ enantiomeren
 - ☐ epimeren
 - ☐ diastereo-isomeren
 - ☐ atropisomeren

15. **Kies** de verwijderingsstap(pen) van de beschermende of sturende groepen tijdens de synthese van **2** uit **1**.


- ☐ **1** → **4**
 - ☐ **4** → **5**
 - ☐ **5** → **6**
 - ☐ **6** → **7**
 - ☐ **7** → **8**
 - ☐ **8** → **9**
 - ☐ **9** → **2**

Opgave	Vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Totaal
T9	Punten	2	2	4	3	2	17	1	1	2	4	2	2	2	44
	Score														

Opgave T9: Synthese van levobupivacaine

Deel I.

Het lokale verdovingsmiddel bupivacaine (marktnaam Marcaine) staat vermeld op de World Health Organization List of Essential Medicines. Het medicijn wordt momenteel gebruikt als een racemisch mengsel terwijl het bekend is dat één enantiomeer van bupivacaine, levobupivacaine, aantoonbaar minder cardiotoxisch is en daardoor veiliger dan het racemische mengsel. Levobupivacaine kan uit het natuurlijke aminozuur L-lysine worden gesynthetiseerd.



L-lysine hydrochloride

1. **Bepaal** de absolute configuratie van het asymmetrische koolstofatoom in L-lysine hydrochloride en **licht** je antwoord toe door het aangeven van de prioriteiten van de substituenten.

Configuratie:	Prioriteit 1 > 2 > 3 > 4:
☐ R	
☐ S	

2. Het voorvoegsel L in L-lysine geeft de relatieve configuratie weer. **Kies** alle correcte antwoorden:


- | |
|---|
| ☐ Alle natuurlijke L-aminozuren zijn linksdraaiend.
☐ Alle natuurlijke L-aminozuren zijn linksdraaiend of rechtsdraaiend.
☐ Alle natuurlijke L-aminozuren zijn (S)
☐ Alle natuurlijke L-aminozuren zijn (R). |
|---|

Vaak willen we dat slechts één van de aminogroepen in L-lysine gaat reageren. Het selectief uitschakelen van één van de aminogroepen kan worden gerealiseerd door een Cu^{2+} zout met een overmaat hydroxide-ionen toe te voegen. Er ontstaat een complex en de niet gereageerde NH_2 groep is beschikbaar voor vervolgreacties.

3. **Teken** de structuurformule van het intermediaire complex als L-lysine reageert als een bidendaat ligand en als er twee L-lysine moleculen coördineren aan één Cu^{2+} ion met een overmaat hydroxide-ionen.

Complex

In de synthese van levobupivacaine zoals hieronder is weergegeven reageert gelukkig dezelfde aminogroep zelfs in afwezigheid van het Cu^{2+} zout.



Vanaf dit punt mag je de afkortingen gebruiken die in bovenstaand schema zijn gebruikt.

4. **Teken** de structuurformule van verbinding **A**, inclusief de juiste stereochemie.

A

5. De omzetting van L-lysine in **A** is (**kies** het/de juiste antwoord(en))

- ☐ een enantioselectieve reactie.
- ☐ een enantiospecifieke reactie.
- ☐ een regioselectieve reactie.

6. **Teken** de structuurformule van verbindingen **B–F**, inclusief de juiste stereochemie.

B $C_{14}H_{20}N_2O_4$	C $C_{16}H_{21}NO_6$
D	E $C_{29}H_{34}N_2O_6S$
F $C_{21}H_{28}N_2O_4S$	

7. Wat is de rol van DCC in de omzetting **C** → **D**?

- ☐ Beschermende groep voor de aminogroep.
- ☐ Beschermende groep voor de hydroxylgroep.
- ☐ Activerende stof voor de vorming van de amide binding.

8. TsCl wordt in de synthese gebruikt voor:

- ☐ De nucleofiele substitutie van de aminogroep.
- ☐ De elektrofile substitutie van de aminogroep.
- ☐ De nucleofiele substitutie van de hydroxylgroep.
- ☐ De elektrofile substitutie van de hydroxylgroep.

9. **Vink** alle mogelijke reagentia aan die gebruikt kunnen worden voor het reagens **H**:


- | | |
|---|---|
| ☐ verdund HCl | ☐ Zn/HCl |
| ☐ K ₂ CO ₃ | ☐ H ₂ SO ₄ |
| ☐ verdund KMnO ₄ | ☐ verdund NaOH |
| ☐ SOCl ₂ | ☐ PCl ₅ |

10. **Teken** de structuurformule van levobupivacaine, inclusief de juiste stereochemie.

Levobupivacaine C₁₈H₂₈N₂O

Deel II.

De synthese van levobupivacaine vereist het gebruik van het enantiomeer zuivere L-lysine. Een gebruikelijke manier om de zuiverheid van de enantiomeer van een aminozuur te bepalen maakt gebruik van de omzetting in een amide met Mosher's zuur (hieronder is structuurformule van de (S) isomeer weergegeven).



(S)-Mosher's zuur

11. **Teken** de structuurformule van de amide die wordt gevormd als de α -aminogroep van L-lysine reageert met (S)-Mosher's zuur. Laat duidelijk de stereochemie van elk chiraal centrum zien.

12. **Hoeveel producten** zullen er gevormd worden uitgaande van een racemisch mengsel van lysine en (S)-Mosher's zuur (ga ervan uit dat alleen de α -aminogroep van lysine reageert)?

- | |
|---|
| ☐ Twee diastereo-isomeren. |
| ☐ Vier diastereo-isomeren. |
| ☐ Een racemisch mengsel van twee enantiomeren. |
| ☐ Vier verbindingen: twee enantiomeren en twee diastereo-isomeren. |

13. **Kies** de methode(n) waarmee kwantitatief de enantiomere zuiverheid van lysine na de reactie met (S)-Mosher's zuur kan worden bepaald:

- | |
|---|
| ☐ NMR spectroscopie. |
| ☐ Vloeistofchromatografie. |
| ☐ Massaspectrometrie. |
| ☐ UV-vis spectroscopie. |